Malvoisie weiss

Vass8R12s066-070

douted a tendential anticol



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp682

The Spirit Weigh

Malvoisie Weiss 8 R12 s 66-70



nlantanlantanlantanlantanl



NOM Malvoisie weess EMPLACEMENT 8 kg 12 166.70 mi Nbre Débourrement Nbre Ferti- Floraison Véraison yeux début mi/déb grap lité début mi/f fin début mi/v fin Maturité Souche 1 2 3 Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M- C Pour : Mill ; 4 Baie: TG - G - M - P Dim: OX D le 21.3.91 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port: 1 euge Vigueur: 1

dantadantadantadantad

ANNEE 1992

NOM Malvoisie Wein EMPLACEMENT 8 R12 1 66. 70

<u>Inntroduction (characters)</u>

	1											
Souche					Ferti- Floraison début mi/f fin				Véraison			Maturité
	yeux	début	mi/déb	grap					début mi/v fin			
1 2 3 4 8		13,3	16,3*	0	Grappe Pour : Baie : Couleu Saveur Pépins Port :	TG - 0 disc-: r : B-0	Mil G - M sph-el Gr-Rs- m - a	1 : - P D: 1-ov-G Rg-N r - fo	im : obov-cy Jus	yl-fus : inc erb		L-M-C

NOM Halvoisie voiss EMPLACEMENT 8 R12 166.70 Souche | Nbre | Débourrement | Nbre | Ferti-Véraison Floraison debut mi/f | fin début mi/v fin Maturité 2 Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M- C 3/ Pour : Mill : Baie: TC - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port : Vigueur :

dantaalaataalaataalaataal

W	MNEE:	1995	Malvo Wei	ine	EMPLACE	MENT.	8 R 12	A 66.	70	Emple	lacen lacen	hend four
ouche	Nbre yeux	Débou début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- litő	Flo debut				raison mi/v	fin	Maturit€
1 f 2 f 3 f		63	13.3. 95(-4)	0	Pour :	TC - Cdisc-spr: B-C: s - : ayec	Mil G - M oh-ell- Gr-Rs-l m - and c - apy	l: - P L -ov-ok Rg-N r - fo	Dim: DOV-cyl	-fus inc -		: L - :- C

ANNEET: 1996
WOM Malvoisie views EMPLACIMENT & RAL A 66.70

	sb	-	9	9	- 1	7	g	
--	----	---	---	---	-----	---	---	--

iche	Whre yeux	Débou	urament mi/děb	Ubue grap	Ferti- litó	Flo debut		Véraison début mi/v fin			naturité.	
1 2 3 4 5	fering for		18,3.	0	Grappe Four : Waie : Couleu Saveur Pépins Fort :	TC - Cdisc-spring B-C	Mil g - M ph-ell Gr-Rs- m - a	1 : - P -ov-o Rg-N r - f	Dim: bov-cy <u>dus</u> ox - he	1-fus : inc		: 1, - :- C

Formulaire de description 1/8 P3 (stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement) Observateur: Année : 2013 CodeIntro: 0Mtp682 CodeVar: 1838 Emplacement: Vass8R12s066-070 Nom Var: Rèze PHENOLOGIE 7 9 5 Descripteur Code très tardive Oiv tardive Moyenne très précoce précoce époque du bourgeonnement 301 tardive très tardive Oiv précoce Moyenne très précoce époque de floraison 302 tardive très tardive Oiv Moyenne très précoce précoce époque de véraison 303 très tardive Moyenne tardive Oiv précoce très précoce maturité physiologique de la baie 304 très tardive tardive Moyenne Oiv très précoce précoce début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) 305 Rouge rouge Oiv Rouge Rougeâtre Jaune coloration des feuilles en automne foncé violet 306 VIGUEUR ET CROISSANCE Très forte Forte Moyenne Faible très faible. vigueur rameaux (floraison) Oiv 351 absent ou croissance prompts-bourgeons (avant Très forte Forte Faible Moyenne Oiv 352 très faible. rognage, ou maturité) RESISTANCE élevée ou très faible ou moyenne Oiv 459 Degré de résistance Botrytis grappe très élevée faible Fertilité Nbre grappes débourrement Date de Nombre de (grappes/10 yeux) (oiv 153) 17/2 début moitié (oiv 301) Souche bourgeons 2 TEO 3 4 nettil 1 6 9 Moyenne 7 Début Date de véraison Date de floraison Taux de Date aoûtement maturité début moitié nouaison début moitié (oiv 306) (oiv 304) (oiv 303) % (oiv 501) (oiv 302) 05.06 02/06 31/07 06/08 SUIVI DE MATURITE Dates IR

Remarque:

Valeur papier PH

Malvoisie Weiss 8 R 12 s. 66-70 (s.70) N° d'ordre : Désignation :

duntum lundu

Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT

nhantanhantanhantanhantanl

Epanoui 1(82) - moyen 183 - globuleux 184. Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 -

cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse (279)

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198 aune

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalégs - en gouftière - autres.

Pace inférieure : glabres (199 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente (80) - sans villosité laineuse (281).

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes (212) - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Mervures: glabre 214 - séteux 217 - velouté 216 - aranéeux 217 auveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 2/32 sans villosité laineuse 283).

Limbe: glabre 220 - séteux 2 velouté 222 - aranéeux 223 duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 sans villosité laineuse 285.

A limbe pra - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 263

A pétiole glabre 234) - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 487.

Totalement - sillon - partiellement.

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

United mate

Malvoisie weiss 8 R 12 s-66-70 (669) un pen faible

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250. ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253. : dos coloré 254 - à raies 258 - vert 256. Noeuds

ventre colore 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte (60) - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue. coloré 2004 vert 265.

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : male 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Malvoisie weiss 8 R 12 s. 66-70.0-4

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

- moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273/

> limbe : glabre 150 - séteux (51) - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 2/15.

Limbe : plan - en gouttière - involuté révoluté - tourmenté. Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

> Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172. Glabre 1/3 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement. Coloré 176 - partiellement coloré 477) - vert 178. Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Formulaire de description 4/8

(entre nouaison et véraison)

Année: 1888

Observateur: Lacombe

Code cépage

Code clone Nom cépage: Malvoisie Weiss

Emplacement: 8 Rus 66.70

Feuille adulte

oiv 065 taille: très petite 1 - petite 3) moyenne 5 - grande 7 - très grande 9.

oiv 067 forme du limbe : cordiforme 1 - cunéiforme 2 - pentagonale 3 - orbiculaire 4 - réniforme 5

oiv 068 nombre de lobes : feuille entière 1 - trois 2 - cinq 3) - sept 4 - plus de sept 5.

oiv 069 couleur face supérieure limbe : vert clair 3 - vert moyen (5) vert foncé 7.

oiv 070 pigmentation anthocyanique nervures face supérieure limbe : nulle(1)- point pétiolaire

rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 071 pigm. antho. nerv. face inf. limbe: nulle 1 - point pétiolaire rouge 2) - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4

oiv 072 gaufrure limbe (entre nervures II et III) : absente 1)- présente 9

oiv 073 ondulation limbe (entre nervures I et II) : absente(1)- présente 9

oiv 074 profil : plan en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

oiv 075 cloqure face supérieure limbe : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5) - forte 7 très forte 9

oiv 084 densité poils couchés entre nervures face inférieure : nulle ou très faible ? .

moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 085 densité poils dressés entre nervures face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible (3) moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 086 densité poils couchés des nervures face inférieure : nulle ou très faible 1)- faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 087 densité poils dressés des nervures face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 moyenne 5 forte 7 - très forte 9.

oiv 087* densité poils dressés face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5) - forte 7

oiv 088 villosité couchée des nervures principales face supérieure : absente 1)- présente 9 oiv 089 villosité dressée des nervures principales face supérieure : absente 1) - présente 9

Pétiole

oiv 090 densité poils couchés : nulle ou très faible 1)- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 oiv 091 densité poils dressés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 oiv 093 longueur du pétiole p/r nervure médiane : beaucoup plus court 1 - plus court 3 - égal 5 plus long 7 - beaucoup plus long 9.

Vassal:

Densité poils couchés limbe face supérieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Densité poils dressés limbe face supérieure : nulle ou très faible (1)- faible 3 - moyenne 5 - forte 7

Couleur du pétiole : vert 178 - partiellement coloré 177 - coloré 176.

Palvoisie weiss 8 R12 s 66.70 (s.4) (per nigoureux)

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment

Lumbun buntara

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce

détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) -cotonneux (9).

entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

Mérithalle de longueur moyenne : cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4)

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé(2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2).
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).